

AGENCE RÉGIONALE
DE LA BIODIVERSITÉ

IAU

île de France

Réactualisation de la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France



Rencontres naturalistes 2018 – 01/12/2018



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
ÎLE-DE-FRANCE



Natur Essonne
Association d'Étude et de Protection
de la nature de l'Essonne



Liste rouge régionale réalisée selon la
méthodologie et la démarche de l'UICN

Avis favorable du CSRPN

Comité d'experts :

Gérard Baudoin (Association de sauvegarde de l'environnement d'Epône), Julien Bottinelli (naturaliste), David Laloi (LPO IDF), Laurent Lavarec (LPO mission rapace), Pierre Le Maréchal (naturaliste), Guilhem Lesaffre (LPO IDF), Christian Letourneau (CERF), Grégoire Lois (CESCO/ARB îdF), Frédéric Malher (LPO IDF), Jean-Philippe Siblet (ANVL), Gilles Touratier (NaturEssonne), Maxime Zucca (ARB îdF)


Analyse des données :

STOC : Audrey Muratet (ARB îdF) et Romain Lorrillière (MNHN)
Atlas des oiseaux nicheurs IDF 2016 : Frédéric Malher (LPO IDF)
Pré-analyse pour l'évaluation : Lucile Dewulf et Maxime Zucca (ARB îdF)

Auditrice externe (méthodologie UICN) :

Lucile Dewulf (ARB îdF)

Critères basés sur :
Tendance de population (A)
Répartition géographique (B)
Taille de population (C, D)



- Apports d'individus extrarégionaux
- Statuts des populations extrarégionales

RENFORCEMENT
RÉGIONAL

↓
20 espèces

2011 : LC

- 35% (VU)



© M. Zucca

NT [VU A2b (-1)]

2011 : LC

- 64% (EN) /incertain
S. Detalle: - 29% en
12 ans



© G. Lecuir

NT [EN A2b (-2)]

2011 : VU [CR D (-2)]

6-10 cp (CR)
+ apports



© A. Duniau

VU [CR D1 (-2)]

2011 : NT pr. D1

NT → LC → NT



© JP. Meriaux

NT pr. D1

Perte d'un tiers des populations en 15 ans pour les espèces de milieux agricoles
(MNHN & CNRS Chizé, 2018)



19 espèces réinterrogées

2011 : LC

2011 : NT [VU A2b (-1)]

2011 : LC

2011 : LC



VU A2ab
-64,6 % / - 48,8 %

© L. Dewulf




VU [EN A2b (-1)]
-73,4 % / - 57,8 %

© A. Trepte



VU A2ab
-73,4 % / - 58,4 %

© Wikicommons



NT pr. A2ab
-60,3 % / - 57,2 %


© F. Losada

EN A2ab


EN A2ab

EN A2ab

VU A2ab



+ RE = 47% !!



Un quart
des espèces
nicheuses en
Île-de-France
menacées.

- Véritable amélioration (Va)
- Véritable détérioration (Vd)
- Espèces occasionnelles devenues régulières (Vp)
- Changement lié à l'amélioration de la connaissance (NVc / NVca)
- Changement lié à une application différente de la méthodologie (NVm)

Changement du statut de 56 espèces entre les deux Listes

CHANGEMENTS DE STATUTS : VÉRITABLES AMÉLIORATIONS

Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	VU	NT	↗
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	VU	NT	↗
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	NT	LC	↗
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	NT	LC	↗
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	EN	VU	↗
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	CR	EN	↗



© F. Jiguet



© M. Zucca

CHANGEMENTS DE STATUTS : VÉRITABLES DÉTÉRIORATIONS

Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	NT	↘
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LC	VU	↘
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	VU	EN	↘
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	EN	CR	↘
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>	NT	VU	↘
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	NT	EN	↘
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC	NT	↘
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	LC	EN	↘
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	LC	EN	↘
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	NT	↘
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NT	VU	↘
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	NT	?
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	NT	VU	↘
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	EN	↘
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	LC	VU	↘
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LC	NT	↘
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	NT	VU	↘
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	LC	VU	↘

CHANGEMENTS DE STATUTS : VÉRITABLES DÉTÉRIORATIONS

Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	CR	RE	↘
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC	NT	↘
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	LC	NT	↘
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC	NT	↘
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	VU	EN	↘
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	VU	EN	↘
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	NT	↘
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	VU	CR	↘
Gobemouche gris	<i>Setophaga striata</i>	NT	VU	↘
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC	VU	↘
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	NT	EN	↘
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	LC	VU	↘
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC	NT	↘
Traquet pâtre, Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	LC	VU	↘
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	LC	NT	↘
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	LC	VU	↘
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	NT	↘
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	NT	EN	↘
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	LC	VU	↘

Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	NAb	CR	→
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	NAb	EN	→
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	NAb	CR	→↗
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	NAb	VU	↗
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	NAb	CR	→
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	NAb	EN	↗



© P. Kientz



© L. Albesa

Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>

NAb	RE	→
NT	LC	↗
DD	LC	→
DD	NA ^{b1}	
NAb	RE	→



© P. Gourdain



© F. Vassen

Pigeon biset

Columba livia

NE

LC



Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

NT

VU



© M. Zucca



© M. Zucca

94 espèces dont le statut n'a pas évolué



- 53 espèces dont les populations sont stables
- 21 espèces dont les populations se portent mieux
- 13 espèces dont les populations déclinent
- 7 espèces pour lesquelles les indices ne sont pas fiables

LES PRINCIPALES MENACES

Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	NT	↘
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LC	VU	↘
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	VU	EN	↘
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	EN	CR	↘
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	NT	VU	↘
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	NT	EN	↘
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC	NT	↘
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	LC	EN	↘
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	LC	EN	↘
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	NT	↘
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NT	VU	↘
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	NT	?
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	NT	VU	↘
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	EN	↘
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	LC	VU	↘
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LC	NT	↘
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	NT	VU	↘
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	LC	VU	↘

LES PRINCIPALES MENACES

Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	CR	RE	↘
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC	NT	↘
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	LC	NT	↘
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC	NT	↘
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	VU	EN	↘
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	VU	EN	↘
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	NT	↘
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	VU	CR	↘
Gobemouche gris	<i>Setophaga striata</i>	NT	VU	↘
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC	VU	↘
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	NT	EN	↘
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	LC	VU	↘
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC	NT	↘
Traquet pâtre, Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	LC	VU	↘
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	LC	NT	↘
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	LC	VU	↘
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	NT	↘
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	NT	EN	↘
Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>	LC	VU	↘

LES PRINCIPALES MENACES



© O. Marchal



© M. Zucca



AGENCE RÉGIONALE
DE LA BIODIVERSITÉ

IAU

île de France



MERCI !

© M. Zucca



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
ÎLE-DE-FRANCE



Nature Essonne

Association d'Étude et de Protection
de la nature de l'Essonne



Liste rouge régionale réalisée selon la
méthodologie et la démarche de l'UICN

Avis favorable du CSRPN